


ATB de elección en infección respiratoria *Altable*



NAC Bajo riesgo (Fine I - II)

Amoxicilina 1000 mg VO cada 8 horas
o
Cefuroxima 500 mg VO cada 12 horas
durante 5-7 días

Patrón ATÍPICO

añadir azitromicina
500 mg/24 h VO
durante 5 días

NAC Fine III *altable* tras 24-48 h de vigilancia

Cefditoreno 400 mg/12 h VO durante 7 días

Patrón ATÍPICO

añadir azitromicina
500 mg/24 h VO
durante 5 días

NAC con bronquiectasias o aspirativa

Amoxicilina/clavulánico 875/125 mgr /8 h vo hasta
completar 7 días

Exacerbación EPOC

Criterios para antibiótico (Criterios de Anthonisen)


- Aumento de volumen del esputo.
- Aumento de purulencia del esputo.
- Cambio de coloración del esputo.

Al menos 2

Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg VO cada
8 horas durante 5 días

ATB de elección en infección urinaria

Altable



Cistitis no complicada

Mujer
No embarazada
Menor de 65 años
Sin diabetes
Sin inmunosupresión
No alteración funcional/anatómica de vía urinaria

Fosfomicina trometamol 3g vo
dosis única,
repetir dosis a las 48h si
persistencia de síntomas
Nitrofurantoína 50mg/8h vo: 5 días

Cistitis complicada

Mujer embarazada
Postmenopausia >65 años
Varón
Diabetes
Insuficiencia renal
Alteración funcional/anatómica de la vía urinaria
Inmunosupresión
Cistitis de repetición (> 3 episodios/año)

ELECCIÓN


Fosfomicina trometamol 3g VO:
3 dosis, intervalos de 48h.
ELECCIÓN EN EMBARAZO
Nitrofurantoína 50 mg/8h VO:
7 días

ALTERNATIVA

Cefixima 400mg/24h VO 7 días
Amoxicilina/clavulánico 500/125 mg/8h: 7 días.

ATB de elección en infección urinaria

Altable



Pielonefritis no complicada

Mujer
No embarazada
No insuficiencia renal
No diabetes
No cirrosis
No sepsis
No alteración funcional/anatómica de vía urinaria)

Solicitar urocultivo y hemocultivos
x 2 previos al antibiótico.

Cefixima 400 mg cada 12 h vía oral 7 días
Ajuste por su MAP a resultado de
Urocultivo

ITU en sondados

Extraer urocultivo **tras** cambio
de sonda y antes de antibiótico

ITU baja

Fosfomicina trometamol 3g VO: 2 dosis, intervalos de 48h.
Nitrofurantoína 50 mg/8h VO: 7 días

ITU alta

Control de la fiebre
Valorar aislamientos microbiológicos previos

ELECCIÓN

Cefixima 400mg/24h VO
7 días.

Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8h
VO 7 días.

ALTERNATIVA